

Piérade de la rave

PIERIDAE

Pieris rapae

(Groupe des Piérides blanches)



Nombre
de génération(s)
par an
jusqu'à 4



Milieus de vie
**jardins,
prairies,
champs cultivés,
lisières de bois,
friches**

Protocoles
concernés

Comment le reconnaître ?

L'adulte

- Envergure: 38-48 mm.
- Apparence: le dessus des ailes est de couleur blanche, avec le bout des ailes antérieures noires parfois parsemées de taches, noires également. L'aile postérieure est plus jaunâtre sur le dessous.

La chenille

- Taille: 25 mm au dernier stade.
- Apparence: la chenille est verte couverte de fins poils duveteux. Une fine ligne dorsale jaune court d'avant en arrière. Sur les flancs, de chaque côté, les lignes jaunes sont plus fines et discontinues.
- Plantes hôtes: les crucifères dont la rave, le navet, le chou cultivé, le colza, la moutarde des champs.

Risque de confusion

Il existe de nombreuses espèces de Piérides, dans le cadre des suivis participatifs présentés dans ce guide elles sont regroupées dans la catégorie «Piérides blanches»*. Les Piérides peuvent être confondues avec la femelle de l'Aurore (p. 40), mais elles ne présentent pas de marbrures vertes sur le revers. La Piérade du navet, qui présente des nervures «suffusées», peut également être confondue avec le Gazé (p. 46).

Piérade de la rave:
1. Dessus des ailes
2. Ailes repliées



Chenille de la Piérade de la rave

Le saviez-vous ?

La Piérade de la rave est sans conteste le papillon de jour le plus commun en France. Comme d'autres espèces de Piérides, un certain nombre de plantes cultivées constituent les plantes hôtes de leurs chenilles. Dans l'Antiquité, le naturaliste latin Pline l'ancien recommandait de planter un crâne de cheval sur un pieu au milieu des cultures pour éloigner les Piérides ! Aujourd'hui, la simple présence d'une végétation herbacée autour des plantes attaquées favorise la présence d'insectes prédateurs.



Autres espèces de Piérides: la Piérade du Navet et la Piérade du chou

